

НАРКОТИКИ И НАРКОМАНИЯ, КАК ПРОБЛЕМА НАШЕГО ОБЩЕСТВА

Студентка В.Д. Рудич, руководитель В.А. Табуненко

Академия Внутренних войск МВД Украины, г. Харьков

В настоящее время Украина оказалась в сложных предкризисных экономических условиях и многие её граждане пытаются уйти от этих проблем за счёт употребления алкоголя и наркотиков. Ежедневно количество таких людей увеличивается и наркозависимых становится всё больше. На первом этапе – регулярное употребление алкоголя и курение травки. На втором этапе – экспериментирование с экстази, ЛСД. На третьем этапе происходит регулярное употребление наркотических препаратов, вызывает привыкание. Четвертый этап влечёт разрушение социальных связей и моральных ценностей. Пятый этап – наступление полной деградации, что приводит к летальному исходу.

Раннее начало наркотизации ведет к большой наследственной отягощенности, задержке психического развития, изменения личности и снижения морально-этического уровня. Существует классификация групп наркотических веществ от наиболее к наименее опасным:

1. **Опиаты** – наркотики, изготавливаемые из мака (морфин, кодеин, тебаин), и их полусинтетические производные. Нередко из-за опиатов отказывают почки. На поздних этапах зависимости выявляют изменения внутренних органов – сердечно-сосудистой системы, печени, нервной системы. Характерны изменения психики.

2. **Барбитураты** – группа лекарственных средств, оказывающих угнетающее влияние на центральную нервную систему. Превышение терапевтической дозы может привести к формированию синдрома зависимости. Передозировки у барбитуроманов практически неизбежны.

3. **Психостимуляторы** – психотропные вещества, активизирующие психическую и физическую активность организма (кокаин, аметамин, метамфетамин, кофеин). У человека употребляющего кокаин наблюдаются следующие симптомы: снижение умственной деятельности, вспыльчивость, тревожность, подозрительность, бессонница, потеря аппетита, раздражительность, повышенная разговорчивость, беспокойство, сильный зуд, галлюцинации, паранойя. Он увеличивает вероятность сердечных приступов и вызывает дыхательную недостаточность, что может вызвать скоротечную смерть.

4. По **экстази** было проведено большое количество исследований. Они свидетельствуют о том, что в таблетках экстази иногда обнаруживаются примеси других субстанций, вплоть до крысиного яда; употребляющие экстази, умирают от обезвоживания, истощения и сердечных приступов.

5. **Диссоциативные наркотики**: ЛСД, кетамин ЛСД снижает способность к разумным суждениям и чувству осторожности. Те, кто принимает ЛСД, могут впасть в довольно продолжительный психоз или в глубочайшую депрессию.

Однако, наркомания излечима. По данным статистики за 2012 год самостоятельно излечилось 7 % наркозависимых, при помощи медицины – 43 %, по иным обстоятельствам (болезнь, тюрьма) – 12 %. Однако, процент наркоманов, не излечившихся от зависимости подводит нас к выводу, что государство должно рассмотреть проект создания сети специальных кабинетов, где наркозависимые могли бы получить за плату консультацию врача и очередную дозу, что убережет хотя бы от антисанитарии, передозировки, некачественных и кустарно изготовленных наркотиков.