

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ СТАН САРКОЇДОЗУ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

**Потейко П.І., Немцова В.Д., Тиха І.А., Березняков В.І., Нессон А.О.,
Риндіна Н.Г., Корчевська Г.І., Кравчук С.Л.**

***Навчально-науковий медичний інститут Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків***

Саркоїдоз є найпоширенішим інтерстиціальним захворюванням легень невідомої природи в Харківській області. Вивчення епідеміології саркоїдозу часто ускладнене його тривалим, практично безсимптомним перебігом, а також труднощами його верифікації.

Метою роботи було вивчення епідеміологічних показників саркоїдозу в Харківській області за останні 30 років (з 1994 по 2023 рр.). Під наглядом перебувало 1635 хворих на саркоїдоз. Вік хворих коливався від 16 до 79 років. Чоловіків було 670 (41 %), жінок - 965 (59 %). Середній вік чоловіків становив $35,5 \pm 0,4$ року, а жінок $45,3 \pm 0,5$ ($p < 0,001$). Чоловіки частіше хворіли у віці 18-50 років (89%), а жінки у віці 25-65 років (91%). Розподіл за соціальним статусом: службовці - 54%, робітники - 23%, непрацюючі - 8%, пенсіонери - 9%, інваліди 3%, студенти - 3%. Згідно з міжнародною класифікацією 0 стадія саркоїдозу була виявлена у 17 пацієнтів (1%), I стадія - у 684 (42%), II стадія - у 923 (55%), III стадія - у 28 (2%). Найбільшу кількість хворих з I, II і III стадіями було виявлено під час профілактичного огляду - 64%.

За нашими даними захворюваність на саркоїдоз у Харківській області в 1994 році становила близько 2,5 на 100 тис. дорослого населення, а поширеність - 6,2. За 30 років ці показники збільшилися більш ніж у 4 рази і відповідно склали серед дорослого населення - 10,8 і 28,4.

Таким чином, можна припустити, що збільшення показників захворюваності та поширеності саркоїдозу, з одного боку, може бути пов'язане з підвищенням рівня знань лікарів про ознаки цієї хвороби та широким впровадженням комп'ютерно-томографічних методів діагностики, а з другого боку, зі змінами в соціально-економічній та екологічній обстановці. Заслужовує на увагу той факт, що у 28% службовців, які захворіли на саркоїдоз, робота була пов'язана з тривалим контактом із великими колективами дітей, підлітків і молоді.