

О.М. ЛИТВИН, д-р фіз.-мат. наук, проф., УПА, Харків

**СИСТЕМА СПЛАЙНІВ КЛАСУ $C^q(R^2)$,
ЯКІ Є R -ФУНКЦІЯМИ ДВОХ ЗМІННИХ**

Запропоновано і досліджено повну систему R -функцій двох змінних, істотно належних до класу $C^q(R^2)$, що складається з R -кон'юнкції $\wedge(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y - |x - y|^{q+1}$ та R -диз'юнкції $\vee(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y + |x - y|^{q+1}$, $q = 0, 1, \dots$ і R -заперечення $\bar{x} = -x$. Ці R -функції є поліноміальними сплайнами степеня $q + 1$, $q = 0, 1, \dots$, дефекту 1. Вони є розв'язками системи рекурентних крайових задач для рівняння Пуассона, права частина яких теж є деякою R -функцією з меншим номером q .

Предложена и исследована полная система R -функций двух переменных, существенно принадлежащих классу $C^q(R^2)$, которая состоит из R -конъюнкции $\wedge(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y - |x - y|^{q+1}$, R -дизъюнкции $\vee(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y + |x - y|^{q+1}$, $q = 0, 1, \dots$ и R -отрицания $\bar{x} = -x$. Эти R -функции – полиномиальные сплайны степеня $q + 1$, $q = 0, 1, \dots$, дефекта 1, являющиеся решениями системы рекуррентных краевых задач для уравнения Пуассона; правая часть этого уравнения Пуассона в свою очередь является R -функцией с меньшим номером q .

Full system of the R -functions of two variables essentially belonging to a class $C^q(R^2)$ is offered and investigated. This system consists from R -conjunction $\wedge(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y - |x - y|^{q+1}$, R -alternation $\vee(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y + |x - y|^{q+1}$, $q = 0, 1, \dots$ and R -negation $\bar{x} = -x$. These R -functions are polynomial splines of the degree $q + 1$, $q = 0, 1, \dots$, defect of these splines is 1. The offered R -functions are the solutions the recurrently system of the boundary value problems for the Poisson's equation. Right part in these Poisson's equations are also R -functions with smaller number q .

Вступ. Теорія R -функцій, створена академіком НАН України *В.Л. Рвачовим* [1], дозволяє будувати рівняння границь складних областей D , на основі логічної структури побудови D за допомогою підобластей D_k , $k = 1, \dots, M$. На даний час недосліджені R -функції, що є сплайнами класу $C^q(R^2)$, $q = 0, 1, \dots$.

Постановка задачі. Задача полягає у побудові повної системи R -функцій, що складається з R -кон'юнкції, R -диз'юнкції та R -заперечення, які є сплайнами класу $C^q(R^2)$, $q = 0, 1, \dots$, дослідженні їх властивостей і методу їх рекурентної побудови.

Основні твердження роботи.

Теорема 1. Система функцій

$$\begin{aligned} \wedge(x, y, q) &= |x|^q x + |y|^q y - |x - y|^{q+1}, q = 0, 1, \dots, \\ \vee(x, y, q) &= |x|^q x + |y|^q y + |x - y|^{q+1}, q = 0, 1, \dots, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\bar{x} = -x$$

є повною системою R – функцій двох змінних, істотно належних до класу $C^q(R^2)$.

Доведення. Для доведення того, що це система функцій двох змінних, істотно належних до класу $C^q(R^2)$, достатньо зауважити, що кожний доданок у них $|x|^q x$, $|y|^q y$, $|x - y|^{q+1}$ має неперервні частинні похідні до порядку q , $q = 0, 1, \dots$ включно, оскільки

$$\frac{\partial^p}{\partial x^p} |x|^q x = \begin{cases} (q+1) \cdots (q-p+2) |x|^{q-p} x \in C^{q-p}(R^2), & p = 1, \dots, q-1, \\ (q+1) \cdots 2 \cdot 1 \cdot |x| \in C(R^2), & p = q, \end{cases}$$

$$\frac{\partial^p}{\partial y^p} |x|^q x = 0, \quad p = 1, 2, \dots, \quad \frac{\partial^p}{\partial x^p} |y|^q y = 0, \quad p = 1, 2, \dots,$$

$$\frac{\partial^p}{\partial x^p} |y|^q y = \begin{cases} (q+1) \cdots (q-p+2) |y|^{q-p} y \in C^{q-p}(R^2), & p = 1, \dots, q-1, \\ (q+1) \cdots 2 \cdot 1 \cdot |y| \in C(R^2), & p = q. \end{cases}$$

Тобто, частинні похідні порядку $p = q, q \geq 1$ є лише неперервними, похідні порядку $p = q + 1$ є розривними.

Згідно з теорією R – функцій [1], для того, щоб довести, що ці функції є R – функціями, достатньо довести їх знакосталість у кожному з чотирьох квадрантів площини Oxy . Доведемо це.

У першому квадранті $x > 0, y > 0$ маємо

$$\wedge(x, y, q) = x^{q+1} + y^{q+1} - |x - y|^{q+1} > 0,$$

оскільки $\max\{x^{q+1}, y^{q+1}\} > |x - y|^{q+1}$.

У другому квадранті $x < 0, y > 0$ поклавши $x = -\beta y$, $\beta > 0$, отримаємо

$$\begin{aligned} \wedge(-\beta y, y, q) &= -\beta^{q+1} y^{q+1} + y^{q+1} - y^{q+1} |\beta + 1|^{q+1} = \\ &= y^{q+1} \left(-\beta^{q+1} + 1 - |\beta + 1|^{q+1} \right) < 0, \end{aligned}$$

оскільки $1 - |\beta + 1|^{q+1} < 0$, $q = 0, 1, \dots$.

Аналогічно доводиться, що $\wedge(x, y, q) < 0$ у четвертому квадранті $x > 0, y < 0$

Той факт, що $\wedge(x, y, q) < 0$ у третьому квадранті $x < 0, y < 0$ витікає з того, що у цьому квадранті $|x|^q x = -|x|^{q+1} < 0, |y|^q y = -|y|^{q+1} < 0, -|x - y|^{q+1} \leq 0$.

При переході точки (x, y) з одного квадранта у інший, маємо

$$\wedge(x, 0, q) = |x|^q x - |x|^{q+1} = \begin{cases} 0, & x \geq 0; \\ -2|x|^{q+1}, & x < 0, \end{cases}$$

$$\wedge(0, y, q) = |y|^q y - |y|^{q+1} = \begin{cases} 0, & y \geq 0; \\ -2|y|^{q+1}, & y < 0. \end{cases}$$

Таким чином, функція $\wedge(x, y, q)$ додатна у першому квадранті, від'ємна у всіх інших трьох квадрантах і дорівнює нулю лише на додатних півосях. Тобто ця функція є R -кон'юнкцією.

Аналогічно доводиться, що функція $\vee(x, y, q)$ є від'ємною лише у третьому квадранті і додатною у першому, другому і четвертому квадрантах. Крім того, вона дорівнює нулю лише на від'ємних півосях. Тобто ця функція є R -диз'юнкцією.

Теорема 1 доведена.

Зуваження 1. Система $\wedge(x, y, 0) = x + y - |x - y|, \vee(x, y, 0) = x + y + |x - y|, \bar{x} = -x$ є добре відомою системою R -функцій [1].

Теорема 2. *Нормальні похідні від R -кон'юнкції та R -диз'юнкції, що визначаються формулами (1), не дорівнюють нулю на відповідних півосях.*

Доведення. Знайдемо частинну похідну за змінною x від R -кон'юнкції $\wedge(x, y, q)$ для $q \geq 1$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \wedge(x, y, q) &= \frac{\partial}{\partial x} |x|^q x + \frac{\partial}{\partial x} |y|^q y - \frac{\partial}{\partial x} |x - y|^{q+1} = \\ &= (q+1)|x|^q - (q+1) \cdot |x - y|^{q-1} (x - y); \\ \frac{\partial}{\partial x} \wedge(x, y, q)|_{x=0} &= (q+1)|y|^{q-1} y = \begin{cases} 0, & \text{якщо } y = 0, \\ (q+1)|y|^{q-1} y \neq 0, & \text{якщо } y \neq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Аналогічно доводиться, що

$$\frac{\partial}{\partial y} \wedge(x, y, q)|_{y=0} = (q+1)|x|^{q-1} x = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x = 0, \\ (q+1)|x|^{q-1} x \neq 0, & \text{якщо } x \neq 0. \end{cases}$$

Знайдемо частинну похідну за змінною x від R -диз'юнкції $\vee(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y + |x - y|^{q+1}$ для $q \geq 1$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \vee(x, y, q) &= \frac{\partial}{\partial x} |x|^q x + \frac{\partial}{\partial x} |y|^q y + \frac{\partial}{\partial x} |x-y|^{q+1} = \\ &= (q+1)|x|^q + (q+1) \cdot |x-y|^{q-1} (x-y);\end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \vee(x, y, q)_{x=0} = (q+1)|y|^{q-1} y = \begin{cases} 0, & \text{якщо } y = 0, \\ (q+1)|y|^{q-1} y \neq 0, & \text{якщо } y \neq 0. \end{cases}$$

Аналогічно доводиться, що

$$\frac{\partial}{\partial y} \vee(x, y, q)_{y=0} = (q+1)|x|^{q-1} x = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ (q+1)|x|^{q-1} x \neq 0, & \text{якщо } x \neq 0. \end{cases}$$

Теорема 2 доведена.

Теорема 3. *Запропоновані R -кон'юнкція та R -диз'юнкція є кусково-поліноміальними сплайнами степеня $q+1$, $q \geq 0$ дефекту 1.*

Доведення. Для доведення твердження теореми 3 вказані функції використовують для своєї побудови операцію знаходження абсолютної величини, тобто для їх доданків справедливі співвідношення

$$\begin{aligned}|x|^q x &= \begin{cases} x^{q+1}, & x > 0; \\ -x^{q+1}, & x \leq 0, \end{cases} & |y|^q y &= \begin{cases} y^{q+1}, & y > 0; \\ -y^{q+1}, & y \leq 0, \end{cases} \\ |x-y|^{q+1} &= \begin{cases} (x-y)^{q+1}, & x-y > 0, \\ -(x-y)^{q+1}, & x-y \leq 0. \end{cases}\end{aligned}$$

Тому вся площина R^2 може бути розбита на вісім підобластей

$$D_1 = \{x > 0, y > 0, y \leq x\}, \quad D_2 = \{x > 0, y > 0, y > x\},$$

$$D_3 = \{x < 0, y < 0, y \leq x\}, \quad D_4 = \{x < 0, y < 0, y > x\}, \quad D_5 = \{x < 0, y > 0, y > -x\},$$

$$D_6 = \{x < 0, y > 0, y \leq -x\}, \quad D_7 = \{x > 0, y < 0, y \leq -x\}, \quad D_8 = \{x > 0, y < 0, y > -x\},$$

у кожній з яких R -кон'юнкція та R -диз'юнкція є поліномами степеня $q+1$

$$\wedge(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y - |x-y|^{q+1} = \begin{cases} x^{q+1} + y^{q+1} - (x-y)^{q+1}, & (x, y) \in D_1 \\ x^{q+1} + y^{q+1} - (y-x)^{q+1}, & (x, y) \in D_2 \\ (-1)^q x^{q+1} + (-1)^q y^{q+1} - (-1)^{q+1} (x-y)^{q+1}, & (x, y) \in D_3 \\ (-1)^q x^{q+1} - (-1)^q y^{q+1} - (-1)^{q+1} (x-y)^{q+1}, & (x, y) \in D_4 \\ (-1)^q x^{q+1} + y^{q+1} - (-1)^{q+1} (x-y)^{q+1}, & (x, y) \in D_5 \\ x^{q+1} + (-1)^q y^{q+1} - (-1)^{q+1} (x-y)^{q+1}, & (x, y) \in D_6 \\ x^{q+1} + (-1)^q y^{q+1} - (x-y)^{q+1}, & (x, y) \in D_7 \\ x^{q+1} + (-1)^q y^{q+1} - (-1)^{q+1} (x-y)^{q+1}, & (x, y) \in D_8 \end{cases}$$

$$\vee(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y - |x - y|^{q+1} = \begin{cases} x^{q+1} + y^{q+1} + (x - y)^{q+1}, (x, y) \in D_1 \\ x^{q+1} + y^{q+1} + (y - x)^{q+1}, (x, y) \in D_2 \\ (-1)^q x^{q+1} + (-1)^q y^{q+1} + (-1)^{q+1} (x - y)^{q+1}, (x, y) \in D_3 \\ (-1)^q x^{q+1} - (-1)^q y^{q+1} + (-1)^{q+1} (x - y)^{q+1}, (x, y) \in D_4 \\ (-1)^q x^{q+1} + y^{q+1} + (-1)^{q+1} (x - y)^{q+1}, (x, y) \in D_5 \\ x^{q+1} + (-1)^q y^{q+1} + (-1)^{q+1} (x - y)^{q+1}, (x, y) \in D_6 \\ x^{q+1} + (-1)^q y^{q+1} + (x - y)^{q+1}, (x, y) \in D_7 \\ x^{q+1} + (-1)^q y^{q+1} + (-1)^{q+1} (x - y)^{q+1}, (x, y) \in D_8 \end{cases}$$

Теорема 3 доведена.

Теорема 4. Система запропонованих R -кон'юнкцій та R -диз'юнкцій \wedge та \vee рекурентними розв'язками наступної системи рівнянь Пуассона:

$$\Delta \wedge(x, y, q + 2) = (q + 3)(q + 2) \wedge(x, y, q), \quad (x, y) \in R^2, \quad q = 0, 1, \dots,$$

$$\Delta \vee(x, y, q + 2) = (q + 3)(q + 2) \vee(x, y, q), \quad (x, y) \in R^2, \quad q = 0, 1, \dots$$

$$\text{Тут } \Delta u(x, y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Доведення. Напишемо наступну систему співвідношень, що є наслідком записаних вище формул

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} |x|^{q+2} x = \frac{\partial}{\partial x} \left((q + 3) |x|^{q+2} \right) = (q + 3)(q + 2) |x|^q x,$$

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} |y|^{q+2} y = \frac{\partial}{\partial y} \left((q + 3) |y|^{q+2} \right) = (q + 3)(q + 2) |y|^q y,$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} |x - y|^{q+3} = (q + 3) \frac{\partial}{\partial x} |x - y|^{q+1} (x - y) = (q + 3)(q + 2) |x - y|^{q+1},$$

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} |x - y|^{q+3} = -(q + 3) \frac{\partial}{\partial y} |x - y|^{q+1} (x - y) = (q + 3)(q + 2) |x - y|^{q+1}.$$

В результаті отримаємо

$$\begin{aligned} \Delta \wedge(x, y, q) &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \wedge(x, y, q) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) (|x|^{q+2} x + |y|^{q+2} y - |x - y|^{q+3}) = \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} |x|^{q+2} x + \frac{\partial^2}{\partial y^2} |y|^{q+2} y - \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |x - y|^{q+3} = (q + 3)(q + 2) |x|^q x + \\ &+ (q + 3)(q + 2) |y|^q y - (q + 3)(q + 2) |x - y|^{q+1} = (q + 3)(q + 2) \wedge(x, y, q). \end{aligned}$$

Таким чином, перше твердження теореми 4 доведене.

Для доведення другого твердження, напишемо наступні співвідношення

$$\begin{aligned} \Delta \vee(x, y, q) &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \vee(x, y, q) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) (|x|^{q+2} x + |y|^{q+2} y + |x-y|^{q+3}) = \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} |x|^{q+2} x + \frac{\partial^2}{\partial y^2} |y|^{q+2} y + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |x-y|^{q+3} = (q+3)(q+2)|x|^q x + \\ &+ (q+3)(q+2)|y|^q y + (q+3)(q+2)|x-y|^{q+1} = (q+3)(q+2)\vee(x, y, q) \end{aligned}$$

Теорема 4 доведена.

Зауваження 1. Вказані R -функції задовольняють відповідним диференціальним рівнянням Пуассона, праві частини яких є теж R -функціями з меншим порядком і при цьому дорівнюють нулю на відповідних півосях, згідно з теоремою 1. Тобто, ці R -функції можна знаходити за допомогою рекурентної процедури, що полягає у розв'язанні послідовності відповідних диференціальних рівнянь Пуассона.

Перспективи подальших досліджень. У подальшому автор планує побудувати сплайни від $n, n = 2, 3, \dots$ змінних, які є n -арними R -функціями та дослідити деякі їх застосування..

Висновки. Побудовану повну систему R -функцій класу $C^q(R^2)$, $q = 0, 1, \dots$, яка складається з R -кон'юнкції $\wedge(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y - |x-y|^{q+1}$, R -диз'юнкції $\vee(x, y, q) = |x|^q x + |y|^q y + |x-y|^{q+1}$, $q = 0, 1, \dots$ та R -заперечення $\bar{x} = -x$. Досліджено деякі їх властивості, зокрема доведено, що ці R -функції є сплайнами степеня q дефекту 1. Цей факт може позитивно вплинути на створення загальної теорії поліноміальних сплайнів, заданих різними формулами на різних частинах заданої області. Запропоновано метод їх рекурентної побудови.

Список літератури. Рвачев В.Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения. К.: Наукова думка, 1982. – 550 с.

Надійшла до редколегії 08.05.2012