

ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОМПОЗИЦІЇ «АМОКСИЛ-К» ТА «ДИМЕКСИД» У ЛІКУВАННІ ЗАГОСТРЕНОГО АПІКАЛЬНОГО ПЕРІОДОНТИТУ

Котелевська Н.В., Костиренко О.П., Зайцев А.В.

Полтавський державний медичний університет, м. Полтава

Консервативна терапія загостреного апікального періодонтиту є однією з проблем стоматології, для вирішення якої проводиться активний пошук та застосування ефективних антибактеріальних засобів, які використовують в комплексному лікуванні періодонтитів.

Мета роботи: клінічне вивчення ефективності застосування медикаментозної композиції «Амоксил-К» та «Димексид» у лікуванні загостреного апікального періодонтиту.

На підставі попередньо проведених мікробіологічних досліджень було обрано антибіотик широкого спектра дії «Амоксил-К» та протизапальний засіб «Димексид», який є розчинником, посилює проникнення лікарських засобів через біологічні мембрани тощо.

Проведено обстеження та лікування 45 хворих на загострений хронічний апікальний періодонтит. Діагноз був підтверджений рентгенологічно. Лікування здійснювалось методом заапекальної терапії при заповненні кореневого каналу медикаментозним комплексом у вигляді пасти, що містить «Амоксил-К» та «Димексид» в рівних об'ємних співвідношеннях 1:1 (композицію замішують *ex tempore*).

Зазначена терапія проводиться у два відвідування. В перше відвідування після діагностичної рентгенографії проводять відкриття порожнини зуба, інструментальну (з обов'язковим розкриттям апікального отвору) і медикаментозну обробку кореневих каналів. Після висушування кореневих каналів за допомогою каналонаповнювача вводять медикаментозну композицію. Зуб закривають герметично.

В друге відвідування, через 2-3 доби, після контрольного огляду, продовжують лікування: проводять іригацію кореневих каналів, здійснюють їх формування та obturaцію. Після контрольної рентгенографії накладають постійну пломбу.

Ефективність лікування в найближчі терміни оцінювали на основі клінічних даних. Позитивними вважали результати, які характеризувались відсутністю скарг хворого, змін ясен, реакції зуба на перкусію. У друге відвідування 7 хворих (15,5%) відмітили зменшення інтенсивності болі в зубі, поліпшення загального стану. Але ознаки запалення ще залишались. Введення композиції «Амоксил-К» та «Димексид» їм проведено повторно. У 84,5% хворих лікування закінчено в два відвідування. У 100% хворих, яких лікували за розробленою методикою, при герметичному закритті зуба не виникло загострення процесу.

Таким чином, медикаментозна композиція «Амоксил-К» та «Димексид» поєднує в собі виражену протимікробну, знеболюючу, протизапальну дію і рекомендується до застосування у лікуванні загострених апікальних періодонтитів. Використання розробленої методики дозволить підвищити ефективність лікування ускладненого карієсу.